

Arrêt

TOUS LES VISITEURS DOIVENT
SE LAVER LES MAINS ET
PRENDRE LES PRÉCAUTIONS
D'USAGE. VÉRIFIER AUPRÈS
DU PERSONNEL AVANT
D'ENTRER.

PERSONNEL



Lavez vous les mains, en plus des pratiques habituelles (cochez tout ce qui s'applique).

Précautions :
contact



Blouse



Gants




Nettoyer et
désinfecter
l'équipe-ment
après usage



Transport
médicalement
essentiel seulement

Précautions :
gouttelettes



Masque



Protection
des yeux



Nettoyer et
désinfecter
l'équipe-ment
après usage



Transport
médicalement
essentiel seulement



Précautions : transmission aérienne




Précautions : transmission
aérienne lors d'une intervention
médicale générant des aérosols jusqu'à

_____ heures

le _____ (date)



Masque
N95



Garder la porte
fermée (chambre
d'isolement des
infections)



Nettoyer et
désinfecter
l'équipe-ment
après usage



Transport
médicalement
essentiel seulement



Personnes immunisées
seulement



Fréquence accrue du nettoyage et
de la désinfection (au moins deux
fois par jour)

Instructions spéciales :

DIRECTIVES

1. Mettre sur la porte ou le rideau séparateur du lit d'une personne exigeant des précautions supplémentaires.
 - En font partie les personnes symptomatiques avec ou sans agent infectieux confirmé en laboratoire.
2. Cocher tout ce qui s'applique.

Exemple no 1 : Si des précautions contre la transmission par gouttelettes ou contact sont requises.

<input checked="" type="checkbox"/> Précautions : contact	<input checked="" type="checkbox"/> Précautions : gouttelettes	<input type="checkbox"/> Précautions : transmission aérienne <input type="checkbox"/> Précautions : transmission aérienne lors d'une intervention médicale générant des aérosols jusqu'à _____ heures le _____ (date)
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exemple no 2a : Si des précautions renforcées contre la transmission par gouttelettes ou contact sont requises.

<input checked="" type="checkbox"/> Précautions : contact	<input checked="" type="checkbox"/> Précautions : gouttelettes	<input type="checkbox"/> Précautions : transmission aérienne <input checked="" type="checkbox"/> Précautions : transmission aérienne lors d'une intervention médicale générant des aérosols jusqu'à _____ heures le _____ (date)
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exemple no 2b : Choisir cette option si des précautions contre la transmission aérienne sont requises en tout temps (p. ex. tuberculose)

<input checked="" type="checkbox"/> Précautions : contact	<input checked="" type="checkbox"/> Précautions : gouttelettes	<input checked="" type="checkbox"/> Précautions : transmission aérienne <input type="checkbox"/> Précautions : transmission aérienne lors d'une intervention médicale générant des aérosols jusqu'à _____ heures le _____ (date)
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Choisir cette option en cas de rougeole, varicelle, etc. Consulter le tableau des maladies infectieuses causées par des microorganismes dans le secteur.

4. Lorsque des précautions contre la transmission aérienne ne sont requises que pour une intervention médicale générant des aérosols (p. ex. précautions renforcées contre la transmission par gouttelettes ou contact), les précautions contre la transmission aérienne doivent être maintenues tout au long de l'intervention et en libérant la chambre. Si l'intervention médicale générant des aérosols est permanente, inscrire « CONTINUELLE » dans l'espace prévu pour indiquer la durée.

5. Dans la section Instructions spéciales, indiquer d'autres renseignements importants sur les précautions (p. ex. : les précautions contre la transmission par contact peuvent être abandonnées 24 h après le début du traitement).

6. Pour en savoir plus sur les précautions supplémentaires et le moment de les prendre, consulter l'un ou l'autre des documents suivants :

- Le protocole particulier s'appliquant aux précautions supplémentaires (p. ex. : précautions contre la transmission par contact, contre la transmission par gouttelettes, etc.)
- Protocole se rapportant à la maladie en question (s'il y a lieu)
- Précautions supplémentaires : Faits saillants des mesures de prévention et contrôle des infections
- Tableau de la présentation clinique et des précautions empiriques
- Tableau des microorganismes et des maladies infectieuses

<input type="checkbox"/>		Personnes immunisées seulement
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<input type="checkbox"/>	Précautions : transmission aérienne
<input checked="" type="checkbox"/>	Précautions : transmission aérienne lors d'une intervention médicale générant des aérosols jusqu'à _____ heures le _____ (date)

Instructions spéciales :
